

**ИНСТРУКЦИЯ**

по медицинскому применению препарата  
**Гипоксен®**

**Регистрационный номер:** P N001939/02

**Торговое название:** Гипоксен®

**МНН или группировочное название:** Полидигидроксифенилентиосульфат натрия

**Лекарственная форма:** капсулы.

**Состав:** активное вещество: полидигидроксифенилентиосульфат натрия (гипоксен®) 250 мг;

материал капсулы: желатин, железа оксид черный (E172), железа оксид красный (E172), железа оксид желтый (E172), титана диоксид (E171).

**Описание:** твердые желатиновые капсулы №3 темно-коричневого цвета. На капсуле белой краской (титана диоксид) нанесен логотип предприятия-изготовителя. Содержимое капсул - порошок черного цвета без запаха или со слабым специфическим запахом.

**Фармакотерапевтическая группа:** антигипоксантное средство

**Код АТХ:** [N07 XX].

**ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА**

**Фармакодинамика.** Гипоксен относится к классу антигипоксантов и антиоксидантов, которые снижают потребление кислорода и увеличивают работоспособность организма в экстремальных ситуациях. Препарат оказывает антигипоксическое действие за счет повышения эффективности тканевого дыхания в условиях гипоксии, особенно в органах с высоким уровнем обмена веществ (головной мозг, сердечная мышца, печень).

Гипоксен обеспечивает: снижение потребления кислорода при значительных физических нагрузках, улучшение тканевого дыхания, уменьшение умственного и физического утомления, успешное выполнение трудоемких физических операций.

**ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ**

- для повышения работоспособности в экстремальных и неблагоприятных условиях, сопровождающихся недостатком кислорода (высокогогорье, условия Заполярья, подводные работы и др.);
- умственное и физическое перенапряжение, операторская деятельность и другие интенсивные нагрузки, сопровождающиеся хронической усталостью и утомляемостью;
- в комплексной терапии тяжелых травматических поражений, кровопотери, обширных оперативных вмешательств, заболеваний органов дыхания (бронхиальная астма, пневмония, обструктивный бронхит);
- в составе комплексной терапии стабильной стенокардии (профилактика приступов стенокардии), артериальной гипертензии, хронической сердечной недостаточности I и II ФК по NYHA.

**ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:** индивидуальная непереносимость, беременность, период лактации, геморрагический инсульт.

**СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ**

Применять у взрослых внутрь, до или во время еды, с небольшим количеством воды. Разовая доза для взрослых составляет 2-4 капсулы. Максимально применяемая суточная доза 12 капсул. Расчет суточной дозы на массу тела приведен в таблице.

Масса тела (кг)	Суточная доза (капсулы)
60-70	3-4
70-80	4-6
80-90	6-8
90-10	8-10
100-120	10-12

**Устранение гипоксии, развивающейся в экстремальных условиях: гиповентиляция легких, высокогорье, подводные работы, работа в условиях повышенной температуры, занятия спортом:** 1 суточная доза за 30-60 минут перед нагрузкой.

**Длительная напряженная умственная деятельность, хроническая усталость, сокращение восстановительного периода после перенесенных чрезмерных физических нагрузок, травм, оперативных вмешательств:** ½ суточной дозы 2 раза в день в течение 2-3 недель. Курсы можно повторять с перерывом на 1-2 недели.

**Комплексное лечение пневмонии:** ½ суточной дозы 2 раза в день, курс 14 дней.

**Комплексное лечение обструктивного бронхита:** по ½ суточной дозы 2 раза в день - 2 курса по 14 дней с интервалом 7 дней.

**Комплексное лечение бронхиальной астмы:** ½ суточной дозы 2 раза в день; курсы по 21-30 дней с интервалом 10 дней.

**Комплексная профилактика стабильной стенокардии:** ½ суточной дозы 2 раза в день, курс 15-30 дней с интервалом 10 дней.

**Комплексное лечение гипертонической болезни:** ½ суточной дозы 2 раза в день, курс 10 дней.

**Комплексное лечение сердечной недостаточности:** ½ суточной дозы 2 раза в день, курс 10-14 дней.

#### **ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ**

Индивидуальная непереносимость препарата, аллергические реакции.

#### **ПЕРЕДОЗИРОВКА**

Симптомы: сухость во рту, тошнота и ощущение дискомфорта в животе, в редких случаях - угнетение дыхания. Лечение: промывание желудка, прием активированного угля, симптоматическая терапия.

#### **ЛЕКАРСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ**

Отрицательных фармацевтических, фармакодинамических и фармакокинетических взаимодействий с другими лекарственными средствами не установлено. Несовместимости препарата с другими лекарственными средствами не выявлено.

#### **ФОРМА ВЫПУСКА**

Капсулы 250 мг. По 30 капсул в банках полимерных и флаконах полимерных. Банка или флакон вместе с инструкцией в пачке картона коробочного или хром-эрзац.

По 10 капсул в упаковку ячеиковую контурную. По 2 или 3 контурные упаковки вместе с инструкцией в пачке из картона коробочного или хром-эрзац.

#### **УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ**

В защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C. Хранить в недоступном для детей месте.

**СРОК ГОДНОСТИ:** 4 года. Не использовать по окончании срока годности.

**УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК:** Без рецепта.

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:** ЗАО «Корпорация ОЛИФЕН». 127299, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д.18, стр.1 тел./факс (499) 153-32-48.

#### **Юридическое лицо, на имя которого выдано регистрационное удостоверение:**

ООО «Валента-Интеллект», Россия

119530, г. Москва, ул. Генерала Дорохова, д. 18/2

Тел. +7 (495) 933 60 80,

факс +7 (495) 933 60 81.

#### **Организация, принимающая претензии потребителей:**

АО «Валента Фарм»

141101, Россия, Московская область,

г. Щелково, ул. Фабричная, д. 2.

Тел. +7 (495) 933 48 62,

факс +7 (495) 933 48 63.