

**ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата**

Граммидин®
нео

Регистрационный номер: ЛСР-010598/08

Торговое название препарата: Граммидин® нео

Международное непатентованное или группировочное название:

граммицидин С + цетилпиридиния хлорид

Лекарственная форма: таблетки для рассасывания

Состав:

1 таблетка содержит:

активные вещества:

граммицидина С дигидрохлорид – 3,20 мг (в пересчете на grammiцидин С – 3,00 мг)

цетилпиридиния хлорида моногидрат – 1,05 мг (в пересчете на цетилпиридиния хлорид – 1,00 мг)

вспомогательные вещества:

кремния диоксид коллоидный – 5,00 мг, тальк – 60,00 мг, ацесульфам калия – 15,00 мг, ароматизатор мятный – 25,00 мг, сорбитол – 1065,75 мг, магния стеарат – 25,00 мг.

Описание: таблетки белого цвета круглые двояковыпуклые с надписью на одной стороне GR.

Фармакотерапевтическая группа: антибиотик+антисептическое средство

Код АТХ: [R02A]

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Комбинированный препарат для лечения инфекционно-воспалительных заболеваний горла и полости рта. В состав препарата входит противомикробное средство grammiцидин С и антисептическое средство - цетилпиридиния хлорид.

Механизм действия grammiцидина С связан с повышением проницаемости цитоплазматической мембраны микробной клетки, что нарушает ее устойчивость и вызывает гибель клетки.

Граммицидин С оказывает выраженное противомикробное действие в отношении возбудителей инфекционных заболеваний полости рта и глотки.

Цетилпиридиния хлорид относится к антисептическим средствам. Подавляет рост и размножение возбудителей инфекционных заболеваний полости рта.

Препарат уменьшает воспаление, оказывает противомикробное действие, смягчает неприятные ощущения в горле, облегчает глотание, при рассасывании вызывает гиперсаливацию, что способствует механическому очищению полости рта и глотки от микроорганизмов.

Фармакокинетика

Препарат обладает местным действием и практически не всасывается в желудочно-кишечном тракте, что определяет практически полное отсутствие системных эффектов.

Показания к применению

Инфекционно-воспалительные заболевания полости рта и горла: ангина, фарингит, тонзиллит, пародонтоз, гингивит, стоматит.

Противопоказания

– повышенная чувствительность к компонентам, входящим в состав препарата;

– детский возраст до 4 лет;

– беременность (I триместр).

Применение при беременности и в период лактации

Не рекомендуется применять препарат при беременности (I) триместр.

Грудное вскармливание на время приема препарата необходимо прекратить.

Способ применения и дозы

Применяется после еды, путем рассасывания во рту не разжевывая.

Непосредственно после применения препарата следует воздержаться от приема пищи и напитков в течение 1-2 часов.

Дозировка для взрослых и детей старше 12 лет: по 1 таблетке 3-4 раза в день.

Дозировка для детей от 4 до 12 лет: по 1 таблетке 1-2 раза в день.

При отсутствии терапевтического эффекта в течение 7 дней приема препарата рекомендуется обращение к врачу.

Побочное действие

В отдельных случаях возможны аллергические реакции на компоненты препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами

Граммидин® нео усиливает эффекты других противомикробных средств местного и системного действия.

Форма выпуска:

Таблетки для рассасывания.

По 6 или 9 таблеток в контурную ячейковую упаковку или в контурную ячейковую упаковку с перфорацией из пленки поливинилхлоридной или пленки поливинилхлоридной/поливинилиденхлоридной или комбинированного материала (полиамид/алюминий/поливинилхлорид) и фольги алюминиевой.

2, 3 или 4 контурные упаковки по 6 таблеток или 2 контурные упаковки по 9 таблеток вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения:

При температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности:

2 года. Не применять после истечения срока годности

Условия отпуска из аптек:

Без рецепта.

Претензии от покупателей принимает предприятие–производитель:

ОАО «Валента Фармацевтика»,

141101, Россия, Московская область, г.Щелково, ул.Фабричная, 2.

Тел. (495) 933-48-62, факс (495) 933-48-63.