

Информация по применению биологически активной добавки к пище ОРЛИКС® Лакто

Свидетельство о государственной регистрации: KZ.16.01.98.003.R.000047.04.21 от 29.04.2021

БАД. Не является лекарственным средством.


Молоко является одним из ценных продуктов животного происхождения. Его наличие в рационе питания обеспечивает организм животными белками, которые оптимально сбалансированы по составу аминокислот; оно является отличным источником легко усвояемых соединений кальция и фосфора, а также витаминов А, В2 и D. Одновременное поступление в организм перечисленных питательных веществ, повышает его защиту от различных неблагоприятных факторов окружающей среды.

Однако многие люди отказываются от молока и молочных продуктов из-за непереносимости лактозы, которая проявляется болью и дискомфортом в области живота, метеоризмом, вздутием живота, диареей.

Причина непереносимости лактозы – дефицит лактазы. Лактаза – это фермент, который расщепляет лактозу на глюкозу и галактозу – полностью усвояемые простые углеводы. Дефицит лактазы обнаруживается у значительной части (в среднем у 75%) взрослых людей.

ОРЛИКС® ЛАКТО – дополнительный источник пищеварительного фермента лактазы для улучшения переваривания и усвоения молочных продуктов.

Содержание активного вещества в одной таблетке: фермент лактаза (бета-галактозидаза) 4 500 ALU (FCC) в одной таблетке, ALU = Acid Lactase Units (лактазные единицы активности).



Состав: гидрофосфат кальция дигидрат (носитель), целлюлоза микрокристаллическая (носитель); микрогранулированная ферментная смесь (лактаза (бета-галактозидаза), (мальтодекстрин)), карбоксиметилцеллюлоза натриевая соль кроссвязанная (носитель), жирных кислот соли магния (агент антислеживающий).

Область применения: Биологически активная добавка к пище – источник пищеварительного фермента лактазы. Помогает предотвратить возникновение симптомов непереносимости лактозы – боли и дискомфорта в области живота, метеоризма, вздутия живота, диареи при употреблении молока и молочных продуктов.

Рекомендации по применению: Взрослым и детям старше 3 лет по 1 таблетке до или во время приема пищи, содержащей лактозу. Таблетки запивают водой. При необходимости возможен прием 2 таблеток в зависимости от количества лактозы в пище или толерантности к ней. Принимать не более 8 таблеток в день.

Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Перед применением БАД детьми необходимо проконсультироваться с врачом-педиатром. Детям до 14 лет принимать по согласованию и под наблюдением врача-педиатра.

Противопоказания: Индивидуальная непереносимость компонентов БАД, беременность, кормление грудью.

Форма выпуска: 30 таблеток по 0,3 г с информационной листовкой в пачке картонной.

Срок годности: 2 года

Условия хранения: хранить в оригинальной упаковке в сухом, недоступном для детей месте при температуре 10-25 °С.

Изготовитель: Generica spol. s r.o., Vrbovska 39,921 01 Piestany, Словацкая Республика.

По заказу АО «Валента Фарм», Российская Федерация.

Организация-импортер и организация, уполномоченная изготовителем принимать претензии от потребителей на территории РФ: АО «Валента Фарм», Российская Федерация, 141108, Московская обл., г. Щелково, ул. Фабричная, 2.

Телефон: +7 (495) 933-48-62, факс: (495) 933-48-63

Организация, принимающая претензии на территории РК: Представительство АО «Валента Фарм», Республика Казахстан, 050009, город Алматы, Алмалинский район, проспект Абая, 151, офис №1102. Телефон: (727) 334-15-51

Продукты, которые могут содержать углевод лактозу: молоко и молочные продукты, колбасные изделия, супы в пакетах, готовые соусы, пудинги, супы-пюре, хлебобулочные изделия, ореховая паста, мороженое, панировочные сухари, торты и пироги, ветчина, кетчуп, горчица, майонез, гамбургеры и чизбургеры, сгущенное молоко, сыпучие специи, бульоны, шоколадные батончики, леденцы, шоколад (исключение составляют некоторые сорта горького шоколада), пончики, омлеты, картофельное пюре.



Если же Вам знакомо чувство вздутия живота после употребления в пищу овощей, бобовых и зерновых (например, капусты, гороха, фасоли или черного хлеба), то это может быть связано с недостаточным перевариванием других типов углеводов:

олигосахаридов, которыми богаты многие растительные продукты. В этом случае избежать вздутия живота может помочь другой БАД ОРЛИКС, содержащий отсутствующий в организме человека пищеварительный фермент - альфа-галактозидазу. ОРЛИКС (альфа-галктозидаза) еще в тонкой кишке расщепляет проблемные олигосахариды до простых, усвояемых углеводов, поэтому в толстую кишку не поступает большое количество субстрата, из которого обитающие там бактерии, производят избыточное количество газа. «Орликс. Любимая еда без вздутия живота»

- Принимать с первыми порциями пищи
- 1-3 таблетки в зависимости от объема потребляемой пищи
- Разрешен с 3-х лет

Более подробная информация на сайте www.orlix.ru